

Памятка

«Противопоказания к вакцинации — что важно знать родителям»¹

Усенко Денис Валерьевич
Д.м.н., ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва



Информация о противопоказаниях помогает понять, когда прививку действительно нужно отложить, когда — нет. Это знание защищает от необоснованных отказов и излишних страхов.



Окончательное решение о наличии противопоказаний всегда принимает врач на очном осмотре



Вакцинация проводится при отсутствии острых заболеваний и обострений хронической патологии



Важно:

1 Не путать противопоказания с ложными страхами.



НЕ являются противопоказаниями: легкий насморк без повышения температуры тела, дисбактериоз, перинатальная энцефалопатия в стадии восстановления, прием гомеопатических препаратов.

2 Временный отвод — не отказ. Если прививку отложили из-за болезни, врач составит индивидуальный график ("догоняющая вакцинация") сразу после выздоровления.

Тип противопоказания	Что это значит?	Что делать?
Абсолютные (прививку не делают никогда)	1 Сильная реакция на предыдущее введение той же самой вакцины: ➤ Температура выше 40°C ➤ Отек/покраснение в месте укола более 8 см 2 Тяжелое осложнение после предыдущей дозы (например, анафилактический шок, ангионевротический отек, энцефалит и другие) 3 Доказанная тяжелая аллергия на компонент вакцины (например, дрожжи, антибиотик)	Врач подбирает альтернативную схему или отменяет данную вакцину. Например, при реакции на АКДС продолжают прививать только от дифтерии и столбняка (АДС)
Временные (прививку откладывают)	1 Острое заболевание (ОРВИ, ангина, кишечная инфекция) с повышением температуры тела и недомоганием 2 Обострение хронической болезни (например, атопического дерматита, бронхиальной астмы)	Дождаться полного выздоровления или перехода в стойкую ремиссию. Обычно прививку делают через 2-4 недели после выздоровления или достижения ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и др. прививки проводятся сразу после нормализации температуры тела

Противопоказания к вакцинации – это не повод для отказа от прививок, а важный инструмент обеспечения их безопасности. Помните, что риск получить тяжелое осложнение от управляемой инфекции (например, коклюша или кори) в сотни раз выше, чем риск реакции на качественную вакцину. **Ваша задача** – доверить оценку состояния ребенка врачу-педиатру и чётко следовать его рекомендациям.



Источники:

1. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок. Методические указания. 2002.

RUM14951/0426
Medical - Медицинский

ИНФОРМАЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Nestlé
Baby & me
Medical