


ИДЕАЛЬНОЙ ПИЩЕЙ ДЛЯ ГРУДНОГО РЕБЁНКА ЯВЛЯЕТСЯ МОЛОКО МАТЕРИ

Смесь **NESTOGEN® 1** с **L.reuteri DSM 17938**

способствует установлению гастроинтестинального комфорта у детей на искусственном вскармливании* и улучшению эмоционального состояния их матерей^{1,2}



Способствует установлению гастроинтестинального комфорта у детей¹*

Улучшает показатели сна детей¹*



Улучшает эмоциональный и поведенческий статус детей²*

Способствует улучшению эмоционального состояния матерей²**

* Для детей на искусственном вскармливании по сравнению с детьми, получавшими другую смесь для здоровых детей на основе цельного белка и без пробиотиков. ** По оценкам педиатров.

Схема перевода на новую смесь для ребёнка от рождения до 1 года*³




Максимальный объём разового кормления и количество приёмов зависят от возраста ребёнка



Каждый раз докармливайте ребёнка до необходимого объёма грудным молоком или привычной смесью

* В случае отсутствия или недостатка грудного молока. ** В каждое кормление.

Способ приготовления



Прежде чем приступить к приготовлению детской смеси, вымойте руки



Тщательно вымойте бутылочку, соску и крышку, чтобы на них не осталось следов молока



Прокипятите их в течение 5 минут. Накройте до использования



Прокипятите питьевую воду в течение 5 минут и затем остудите до 37 °C



Руководствуясь таблицей кормления, налейте в бутылочку точно отмеренное количество тёплой воды



Перед использованием мерной ложки, находящейся в упаковке, необходимо тщательно её вымыть и полностью высушить



Руководствуясь таблицей кормления, добавьте точное количество мерных ложек сухого порошка в соответствии с возрастом вашего ребёнка



Закройте бутылочку и взболтайте её до полного растворения порошка



После приготовления смеси упаковку с продуктом следует плотно закрыть.

Примечание. Порцию смеси следует готовить непосредственно перед кормлением. Точно следуйте инструкции по приготовлению. Для приготовления смеси необходимо использовать прилагаемую мерную ложку, заполненную без горки. Разведение неправильного количества порошка – большего или меньшего по сравнению с количеством, указанным в таблице, – может привести к обезвоживанию организма ребёнка или нарушению его питания. Указанные пропорции нельзя изменять без совета медицинского работника.



Использование некипячёной воды и некипячёных бутылочек, а также неправильное хранение, транспортировка, приготовление и хранение могут привести к неблагоприятным последствиям для ребёнка



Оставшаяся после хранения разведённая смесь не подлежит хранению и последующему использованию

Правила хранения детских смесей и молочка:

-  После использования ложку для детской смеси/молочка следует **сразу убрать обратно** в упаковку. Ложка **не должна контактировать** с другими поверхностями.
-  **Не рекомендуется пересыпать** детские молочные смеси и молочко в другие ёмкости, их следует хранить в оригинальной упаковке. Для обеспечения максимальной герметичности упаковки следите, чтобы продукт не попадал на края банки.
-  Хранить **в отдельно выделенном сухом месте**, при температуре не более 25 °С и относительной влажности воздуха **не более 75%** вдали от прямых солнечных лучей до окончания срока годности, указанного на упаковке.
-  Открытую упаковку смеси или молочка нельзя хранить дольше **3 недель**. **Не рекомендуется хранить в холодильнике.**
-  При обнаружении нехарактерного цвета, запаха, потери сыпучести, слипшихся комочков в смеси/молочке **не используйте** этот продукт!

Смесь NESTOGEN® 1 – с рождения. Перед применением продукта необходима консультация специалиста.

L. reuteri DSM 17938 – штамм лактобактерии ройтери DSM 17938, используется по лицензии на патент №2435844 компании BioGaia AB, действует на территории РФ.

1. Булатова Е.М., Щепкина Е.В., Доготарь О.С., Савинова Г.Ю., Былкина Т.Е. Результаты сравнительного исследования адаптированной детской молочной смеси NESTOGEN® 1 с пробиотиком Limosilactobacillus reuteri DSM 17938. Часть 1: переносимость, влияние на параметры сна младенцев. Вопросы практической педиатрии. 2026.
2. Булатова Е.М., Щепкина Е.В., Украинцев С.Е., Савинова Г.Ю., Былкина Т.Е. Результаты сравнительного исследования адаптированной детской молочной смеси NESTOGEN® 1 с пробиотиком Limosilactobacillus reuteri DSM 17938. Часть 2: оценка влияния на эмоциональный и поведенческий статус младенцев. Вопросы практической педиатрии. 2026.
3. Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. Методические рекомендации. 2019

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Мы считаем, что грудное вскармливание является идеальным началом питания для младенцев и полностью поддерживаем рекомендацию Всемирной организации здравоохранения об исключительно грудном вскармливании в течение первых шести месяцев жизни с последующим введением адекватного питательного прикорма вместе с продолжением грудного вскармливания до двухлетнего возраста и более. Мы также понимаем, что грудное вскармливание не всегда возможно для родителей. Мы рекомендуем медицинским работникам информировать родителей о преимуществах грудного вскармливания. Если родители решают отказаться от грудного вскармливания, медицинские работники должны проинформировать родителей о том, что такое решение может быть трудно отменить и что введение частичного кормления из бутылочки уменьшит количество грудного молока. Родители должны учитывать социальные и финансовые последствия использования детской смеси. Поскольку младенцы растут по-разному, медицинские работники должны посоветовать родителям подходящее время для введения прикорма. Детские смеси и продукты прикорма всегда следует готовить, использовать и хранить в соответствии с инструкциями на этикетке, чтобы избежать риска для здоровья ребёнка.

®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S. A. Товар зарегистрирован.

Medical – Медицинский.

RUM15154/0326

