Институт питания Нестле

Срыгивания:

Обратный заброс содержимого желудка в ротовую полость

Нет причин для прекращения грудного вскармливания

Распространенная проблема, которой страдает более 50% детей в возрасте 3-4 месяцев

*Пик распространенности приходится на **4 месячный возраст ребенка***

Нет показаний для лекарственной терапии, если срыгивания не ухудшают параметры роста и развития ребенка

Научно доказано, что пробиотик L.reuteri DSM 17938 ускоряет опорожнение желудка и уменьшает частоту эпизодов срыгиваний

Частично гидролизованный белок быстрее эвакуируется из желудка (по сравнению с интактным белком), что может способствовать уменьшению частоты эпизодов срыгиваний

Алгоритм ведения детей со срыгиваниями



Адаптировано, источник [1]Vandenplas et al., 2016

***АБКМ – аллергия к белкам коровьего молока**
ИВ – искусственное вскармливание

****CoMiSS: метод определения связи между симптомами и применением детской смеси на основе коровьего молока (Vandenplas et al. PLoS One. 2018 Jul 18;13(7):e0200603)**

*****Синдром Сандифера включает триаду симптомов: грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит и кривошею, сочетающуюся с причудливой позой и произвольными «извивающимися» движениями шеи, головы и иногда туловища**

Информация только для медицинских работников

Список литературы:
[1]Vandenplas Y et al. Acta Paediatrica 2016;105:244-252. Vandenplas Y. et al. J Pediatr Gastroenteol Nutr 2016;19(3):153-161. Benninga MA et al. Gastroenterology 2016;150:1443-1455. Nelson SP et al. Arch Pediatr Adolesc Med; 1997:151(6):569-72. Indrio F et al. Euro J Clin Invest 2011;41(4): 417-22. Indrio F et al. Nutrients. 2017 Oct 28;9(11).